



Rekommendation för prioritering av vaccination mot influensa A(H1N1)

Svenska Barnläkarföreningens sektion för Endokrinologi och Diabetes rekommenderar att alla barn och ungdomar med diabetes, som är äldre än 6 månader, prioriteras för tidig influensavaccination. Orsaken är att blodsockerkontrollen kan försämrans kraftigt vid en feberinfektion hos alla barn med diabetes, oavsett tidigare metabol kontroll.

Syskon och föräldrar bör erbjudas vaccination prioriterat i de fall där barnet med diabetes är yngre än 6 månader och inte självt kan vaccineras. För syskon och föräldrar i övriga familjer med barn med diabetes är det viktigt att alla vaccineras i ett senare skede för att minimera smittorisken. I övrigt gäller samma rekommendation för dem som för den allmänna befolkningen, d.v.s. vaccination på t.ex vårdcentral, skola eller BVC.

Indikationen för Tamiflubehandling vid diabetes hos barn och ungdomar är densamma som för befolkningen i stort och ska sättas in på kliniska grunder då ett allvarligt förlopp befaras. Profylax med Tamiflu till barn och ungdomar med diabetes som enda riskfaktor rekommenderas inte.

Övriga patientgrupper inom barnendokrinologin:

Alla barn som är i behov av kortisonsubstitution och är äldre än 6 månader, prioriteras för tidig vaccination.

Det finns ett antal andra diagnoser som också bör prioriteras för tidig vaccination men där individuell bedömning bör ske för varje fall på respektive mottagning.

Till hemsidan för [Endokrinologi & Diabetessektionen](#)